

# Avertissements agricoles

**POITOU  
CHARENTES**


BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

EDITION GRANDES CULTURES

BULLETIN N° 69 (7/85) du 11 AVRIL 1985

AGIR	.	Sur orge contre la rhynchosporiose et éventuellement l'oïdium
	.	Sur blé contre le piétin-verse en situation favorable
SURVEILLER	.	Sur blé la septoriose et éventuellement l'oïdium
	.	Sur colza les insectes des boutons floraux
ATTENDRE	.	Pour la rouille brune du blé et la rouille naine de l'orge

## COLZA

### Insectes des boutons floraux

La plupart des colzas sont au stade E, voire en tout début de floraison (F1).

#### . Meligèthes

Des méligèthes ont été notés dans toute la région. Cependant le seuil d'intervention n'a été que très rarement atteint.

. Si le colza est en début floraison, il n'y a plus de risques méligèthes.

. Si le colza n'est pas encore au stade F1, le risque subsiste, il est donc nécessaire de continuer à effectuer des sondages au champs jusqu'à ce stade (Seuil d'intervention: 50 Méligèthes/50 inflorescences au stade D1 et D2; 100 à 150 méligèthes/50 inflorescences au stade E).

#### . Charançon des siliques

Les premiers charançons ont été piégés, début Avril. L'activité au champ est, jusqu'à présent, quasiment nulle. D'autre part les dissections effectuées au laboratoire montrent des femelles encore inaptes à pondre.

Il est donc trop tôt pour envisager un traitement.

(seuils d'intervention : 50 charançons/50 plantes).

## TOURNESOL

### Desherbage

Noter qu'en post-levée il existe un troisième herbicide homologué en plus de Fervin et Fusilade:

**Fervinal** : qui s'emploie à 1,5 l - 2,0 l/ha + 3 l d'huile de la levée au stade montaison des graminées. Application sur végétation active. Agit essentiellement sur graminées. (sauf pâturin) 1,5 Kg/ha + 3 l d'huile contre graminées vivaces.

#### STADE F1 : FIN DE SENSIBILITE AUX MELIGETHES



Dès la floraison n'utiliser que des produits portant la mention "non dangereux pour les abeilles" et traiter en fin d'après-midi.

*P.1.2*


SERVICE DE LA PROTECTION  
DES VÉGÉTAUX  
13, Rte de la Forêt - BIARD  
86000 POITIERS  
Tél. : (49) 58.39.02

Publication périodique - Imprimerie de la Station Poitou-Charentes  
Directeur Gérant : R. GUILLEMENET  
CPPAP n° 1664 A.D. Abonnement annuel **100 F.**  
Chèque bancaire ou postal à l'ordre du  
sous régisseur de recettes Avertissements Agricoles

## CEREALES

### BLE

**Piétin Verse** : Envisager un traitement contre le piétin-verse lorsque 10 talles sur 40 sont atteintes au niveau de l'avant dernière gaine.

Situations à risque: Nord de la Vienne, précédents blé et semis très précoce.


En terres de limons battants ne pas confondre piétin verse et rhizoctone plus particulièrement présent.

**Septoriose**: *Septoria tritici* est très présente et devrait être favorisée par les pluies actuelles. Il convient de préférer pour l'intervention contre le piétin-verse un fongicide également actif sur septoriose.

Une intervention spécifique contre la septoriose s'envisage lorsque la maladie est présente sur l'étage foliaire F3 définitif, ce qui n'est pas le cas pour le moment.

**Oïdium** : Surveiller l'oïdium en Nord-Charente ou sur la variété Beauchamp.

**Rouille brune** : Peu observée. Ne pas intervenir actuellement.



### ORGE

**Rhynchosporiose**: De fortes attaques sont enregistrées cette année sur l'ensemble des parcelles. Une intervention est nécessaire au stade 1-2 noeuds.

**Oïdium** : Observé surtout en Nord-Charente. Surveiller son évolution. Choisir pour le traitement contre la rhynchosporiose un produit également actif sur l'oïdium si 50 % des pieds sont atteints.

**Helminthosporiose** : peu présente actuellement

**Rouille naine** : très limitée.